vertissements ® agricoles Auvergne & Limousin

ISSN: 0763 - 7756

Grandes cultures

Le 22 Juin 1987

TOURNESOL

Pucerons: Traitement non rentable dans la majorité des situations

TOURNESOL

Stade - Boutons étoilés - El

PUCERONS

★Situation

Depuis une quinzaine de jours, des pucerons vers sont notés en culture. Il s'agit du Brachycaudus hélicrysi (pucerons vert du prunier).

Les infestations sont de l'ordre de 30 à 50 pucerons par plante, mais souvent celles-ci sont très irrégulières au niveau de la parcelle.

Quelques parcelles présentent des infestations légèrement plus importantes (quelques pieds en foyers ont des populations de plus de 100 pucerons par plante).

De nombreux auxiliaires sont observés : coccinelles, syrphes,

chrysopes.

♣ Préconisation

L'expérimentation conduite les années passées a prouvé que la nuisibilité des attaques de pucerons n'est pas évidente. Ainsi sur 20 essais mis en place depuis 1984, la nuisibilité n'a pu être mise en évidence seulement dans 2 essais.

Une intervention peut donc se justifier seulement en cas de pullulation de pucerons ainsi le seuil a été fixé à plus de 100 pucerons par plante.

Ce niveau d'infestation peut être atteint dans quelques parcelles mais ce n'est pas la généralité. Une visite de parcelle est conseillée avant toute intervention.

Le stade "houton étoilé" est le bon stade pour une éventuelle En effet, un traitement trop précoce n'évite pas une recolonisation. intervention.

[—] N° de série : 563

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX RN 89 Marmilhat 63 370 LEMPDES

Publication périodique

Directeur-Gérant : B . MORIN

CPPAP N° 525 AD - Abonnement Annuel :

¹⁴⁰ F

[—] Chèques : Régie de recettes D.R.A.F.

_ Imprimerie D.R.A.F.

ATTENTION AU CHOIX DU PRODUIT : UTILISER SEULEMENT UN INSECTICIDE RESPECTANT LES AUXILIAIRES QUI SONT ABONDANTS ACTUELLEMENT ET AUSSI LES ABEILLES :

- PIRIMOR À 0,25 KG/HA SERK À 1,5/HA

SCLEROTINIA

★ Situation

Depuis le 10 Juin, des attaques de sclérotinia s'observent au niveau du bourgeon terminal dans de nombreuses parcelles. Les dégâts sont plus graves en Limagne Nord et aussi dans l'Allier.

★ Préconisation Aucune intervention fongicide ne peut être conseillée dans l'état de nos connaissances.

BLE

(Fin floraison - 10-5-3 Stade Grain aqueux - 10-5-4

MALADIES

★ Situation

évolue modérément.

Progression surtout de la Septoriose. La Rouille brune

* Préconisation

Seuls les blés tardifs peuvent encore nécessiter une

protection.

INSECTES

→ Situation

Toujours peu de pucerons sur épis et activité très faible des cécidomyies.

▶ Préconisation

Ne pas intervenir

SPV - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.